

Cvičení 6

Příklad 1: Pro každou z následujících sekvencí symbolů rozhodněte, zda se jedná o a) term, b) formuli predikátové logiky (používejte běžné konvence pro vypouštění závorek). Pokud se jedná o formuli predikátové logiky, určete, zda je tato formule i) atomická, ii) uzavřená; pokud není formule uzavřená, určete množinu volných proměnných, které se v ní vyskytují.

U sekvencí symbolů, které jsou termem nebo formulí, nakreslete příslušný abstraktní syntaktický strom.

Berte jako dané, že:

- P, Q a R jsou predikátové symboly, přičemž P je unární a Q a R jsou binární,
- f je unární funkční symbol a g je binární funkční symbol,
- c a d jsou konstantní symboly.

- | | |
|--|---|
| 1. $\neg(\neg p \rightarrow (\neg(\neg r)))$ | 15. $\forall x R(f(x))$ |
| 2. $\forall x \in A : P$ | 16. $\forall x R(f(x), f(x), f(x))$ |
| 3. $f(c)$ | 17. $\forall x P(f(x, x))$ |
| 4. $R(c, d)$ | 18. $\forall x P(g(x, x))$ |
| 5. $\forall x \exists y P(c)$ | 19. $f(f(g(c, d)))$ |
| 6. $\forall x \exists y f(R(x, y))$ | 20. $P(f(g(c, d)))$ |
| 7. $\forall x \exists y P(g(x, y))$ | 21. $P(f(d)) \rightarrow \forall x P(x)$ |
| 8. $\forall x \exists y f(g(x, y))$ | 22. $P(f(g(f, f)))$ |
| 9. $\forall x \exists y P(g(f(f(x)), c))$ | 23. $P(f(g(c, x)))$ |
| 10. $\forall x (P(d) \wedge \exists y Q(y, c))$ | 24. $\forall x (f(x) \rightarrow g(c, x))$ |
| 11. $P(d) \wedge \exists y Q(y, c)$ | 25. $\forall x P(f(x) \rightarrow g(c, x))$ |
| 12. $P(x) \wedge \exists y Q(d, c)$ | 26. $\forall x P(\neg f(x))$ |
| 13. $\forall x \exists y (R(x, f(y)) \leftrightarrow \exists z Q(z, c))$ | 27. $\forall x \neg P(f(x))$ |
| 14. $\forall x P(g(x))$ | 28. $\neg(P(f(x)) \vee Q(y, z))$ |

Příklad 2: Následující tvrzení formulovaná v přirozené řeči zapište formálně formulí predikátové logiky.

Poznámky:

- Nejprve si vždy rozmyslete, jaké jednotlivé predikátové, funkční a konstantní symboly ve formuli použijete, co budou tyto symboly reprezentovat a jaké budou jejich arity.
- Jako mezikrok při vytváření výsledné formule, vytvořte nejdříve „formuli“, kde jako predikátové, funkční a konstantní symboly mohou být použity standardní matematické symboly jako třeba $>$, $+$, \cap , \in , \subseteq , zápis číselných konstant pomocí číslic, apod., a kde jsou použity běžné konvence, jako například infixový zápis binárních funkčních a predikátových symbolů.
- Na základě „formule“ vytvořené v předchozím kroku, vytvořte odpovídající formuli, která je vytvořena přesně podle formální definice syntaxe formulí predikátové logiky (přičemž je možné použít standardní konvence pro vynechávání závorek) a kde jsou jako predikátové, funkční a konstantní symboly použita pouze písmena latinské abecedy.

- Pro jakékoliv přirozené číslo existuje prvočíslo větší než toto číslo.
- Některé přirozené číslo není beze zbytku dělitelné číslem 5 ani číslem 7.
- Pro každé reálné číslo větší než 10 platí, že po odečtení čísla 9 dostaneme kladné číslo.
- Prázdná množina je podmnožinou každé množiny.
- Pro každé dvě množiny platí, že jsou obě podmnožinami jejich sjednocení.
- Průnik dvou množin je podmnožinou obou těchto množin.

Příklad 3: Předpokládejme, že

- P a Q jsou unární predikátové symboly a R je binární predikátový symbol,
- f je binární funkční symbol a g je unární funkční symbol,
- c a d jsou konstantní symboly.

Pro každou z následujících formulí a každou z následujících interpretací a valuací určete pravdivostní hodnotu dané formule při dané interpretaci a valuaci.

Formule:

- $R(c, d)$
- $R(c, d) \rightarrow R(c, x)$
- $\forall x \forall y \forall z (R(x, y) \wedge R(y, z) \rightarrow R(x, z))$
- $\exists x (Q(x) \wedge \forall y R(y, g(x)))$
- $\exists x \neg P(f(x, y))$
- $\forall x \exists y \neg R(x, g(g(y)))$

Interpretace:

- Interpretace \mathcal{A} , kde univerzem je množina $A = \{\alpha, \beta, \gamma\}$.

Predikátům P , Q a R jsou přiřazeny následující relace:

- $P^{\mathcal{A}} = \{\alpha, \gamma\}$
- $Q^{\mathcal{A}} = \emptyset$
- $R^{\mathcal{A}} = \{(\alpha, \beta), (\beta, \gamma), (\alpha, \gamma)\}$

Funkčním symbolům f a g jsou přiřazeny funkce $f^{\mathcal{A}}$ a $g^{\mathcal{A}}$ popsané následujícími tabulkami:

$f^{\mathcal{A}}$	α	β	γ	x	$g^{\mathcal{A}}(x)$
α	β	α	γ	α	β
β	β	β	β	β	γ
γ	α	γ	β	γ	γ

Konstantním symbolům c a d jsou přiřazeny prvky α a β , tj. $c^{\mathcal{A}} = \alpha$ a $d^{\mathcal{A}} = \beta$.

Předpokládejme valuaci v , kde $v(x) = \gamma$, $v(y) = \alpha$ a $v(z) = \alpha$.

- Interpretace \mathcal{B} , kde univerzem je množina přirozených čísel $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.

- Predikátovému symbolu P je přiřazena relace $P^{\mathcal{B}} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \bmod 2 = 0\}$.
- Predikátovému symbolu Q je přiřazena relace $Q^{\mathcal{B}} = \{x \in \mathbb{N} \mid x = y^2 \text{ pro nějaké } y \in \mathbb{N}\}$.
- Predikátovému symbolu R je přiřazena relace $R^{\mathcal{B}} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x < y\}$.
- Funkčnímu symbolu f je přiřazena funkce $f^{\mathcal{B}} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, kde $f^{\mathcal{B}}(x, y) = x + y$.
- Funkčnímu symbolu g je přiřazena funkce $g^{\mathcal{B}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, kde $g^{\mathcal{B}}(x) = x + 1$.

- Konstantám c a d jsou přiřazeny prvky 0 a 2, tj. $c^B = 0$ a $d^B = 2$.

Předpokládejme valuaci v , kde $v(x) = 7$, $v(y) = 2$, $v(z) = 9$.

Příklad 4: Pro každou z následujících formulí najděte nějakou interpretaci, která je jejím modelem, a nějakou interpretaci, která jejím modelem není.

1. $\forall x((P(x) \wedge Q(x, a)) \rightarrow R(x))$
2. $\forall x(P(a, x) \rightarrow Q(x))$
3. $\exists x(P(x, f(x)))$

Příklad 5: Uveďte příklad interpretace, ve které současně platí všechny čtyři následující formule:

- $\neg \exists x R(x, x)$
- $\forall x \exists y R(x, y)$
- $\exists x \forall y (\neg R(y, x))$
- $\forall x \forall y \forall z (R(x, y) \rightarrow (R(y, z) \rightarrow R(x, z)))$

Příklad 6: Zjistěte, zda daný závěr logicky vyplývá z daného předpokladu. Vaše odpovědi zdůvodněte.

- a) předpoklad: $\forall x \exists y P(x, y)$, závěr: $\exists y \forall x P(x, y)$
- b) předpoklad: $\exists x \forall y R(x, y)$, závěr: $\forall y \exists x R(x, y)$
- c) předpoklad: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$, závěr: $\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$
- d) předpoklad: $\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$, závěr: $\exists x (P(x) \wedge Q(x))$
- e) předpoklad: $\exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$, závěr: $\exists x (P(x) \vee Q(x))$
- f) předpoklad: $\exists x (P(x) \vee Q(x))$, závěr: $\exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
- g) předpoklad: $\forall x (P(x) \wedge Q(x))$, závěr: $\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$
- h) předpoklad: $\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$, závěr: $\forall x (P(x) \wedge Q(x))$
- i) předpoklad: $\forall x (P(x) \vee Q(x))$, závěr: $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$
- j) předpoklad: $\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$, závěr: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
- k) předpoklad: $\forall x (\forall y P(y) \rightarrow Q(x))$, závěr: $\forall y P(y) \rightarrow \forall x Q(x)$
- l) předpoklad: $\forall x (P(x) \rightarrow \forall y Q(y))$, závěr: $\exists x P(x) \rightarrow \forall y Q(y)$

Příklad 7: Pomocí Vennových diagramů zjistěte, zda daný závěr logicky vyplývá z uvedených předpokladů. Pokud závěr z těchto předpokladů nevyplývá, uveďte příklad interpretace, kde platí předpoklady a neplatí závěr.

- a) *Všichni živočichové jsou smrtelní.*
Všichni lidé jsou živočichové.

Všichni lidé jsou smrtelní.
- b) *Všichni lidé potřebují k životu kyslík.*
Lidé jsou živé organismy.

Všechny živé organismy potřebují k životu kyslík.
- c) *Někteří lidé jsou lháři.*
Adam je člověk.

Adam je lhář.
- d) *Z obrazů jsou cenné právě ty, které jsou portréty.*
Všechny portréty jsou olejomalby.
Některé z obrazů nejsou olejomalby.

Obrazy, které nejsou olejomalby, nejsou cenné.
- Poznámka:* Pro jednoduchost předpokládejte, že všechny prvky universa jsou obrazy.
- e) *Všechna celá čísla jsou racionální.*
Existuje alespoň jedno racionální číslo, které není celé.
Každé reálné číslo buď je racionální nebo není racionální.

Existuje reálné číslo, které je racionální.
- Poznámka:* Pro jednoduchost předpokládejte, že všechny prvky universa jsou čísla.

Příklad 8: Které z následujících dvojic formulí jsou logicky ekvivalentní? Vaše odpovědi zdůvodněte.

1. Je $\exists xP(x) \Leftrightarrow P(x)$?
2. Je $\exists y\exists xP(x) \Leftrightarrow \exists xP(x)$?
3. Je $\exists y\exists xP(x) \Leftrightarrow \exists yP(y)$?
4. Je $\exists xP(x, y) \Leftrightarrow \exists yP(y, y)$?
5. Je $\forall xP(x, y) \Leftrightarrow \forall yP(y, y)$?
6. Je $\forall x\forall yP(x, y) \Leftrightarrow \forall y\forall yP(y, y)$?

Příklad 9: Pomocí ekvivalentních úprav odvoďte:

- a) $\neg\forall y\exists xP(x, y) \Leftrightarrow \exists y\forall x\neg P(x, y)$
- b) $\exists x\forall yQ(y) \Leftrightarrow \forall y\forall xQ(y)$
- c) $\forall xP(x) \rightarrow \exists z(\neg\forall y(Q(y) \vee R(z, y))) \Leftrightarrow \exists x\neg P(x) \vee \exists z\exists y(\neg R(z, y) \wedge \neg Q(y))$
- d) $\neg\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$
- e) $\neg\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow \forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
- f) $\forall x(P(x) \rightarrow (Q(x) \wedge R(x))) \Leftrightarrow \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(P(x) \rightarrow R(x))$
- g) $\exists x(P(x) \wedge (Q(x) \vee R(x))) \Leftrightarrow \exists x(P(x) \wedge Q(x)) \vee \exists x(P(x) \wedge R(x))$

Příklad 10: Připomeňme, že symbol “=” označuje rovnost (identitu). Vysvětlete v přirozené řeči, co říká následující formule:

$$\exists x \exists y (\neg(x = y) \wedge \forall z (z = x \vee z = y))$$

Jak vypadají modely této formule?

Příklad 11: Řekněme, že P je unární predikát. Pomocí formulí predikátové logiky vyjádřete následující tvrzení (můžete využít symbol “=”):

- a) Existují alespoň tři prvky s vlastností P (tj. pro alespoň tři různé prvky x platí $P(x)$).
- b) Existují nejvýše dva prvky s vlastností P (tj. pro nanejvýš dva různé prvky x platí $P(x)$).